

Type: **1**

Pointe des Roches

n° régional: 0000053

n° national: 030030061

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

Bien que située dans la ville de Kourou, dans un secteur fréquenté, cette pointe ouest de la rivière de Kourou constitue un site ornithologique remarquable. Elle constitue une zone de nourrissage à marée basse pour les limicoles (Calidris canutus, Calidris fuscicollis, Calidris himantopus, Calidris pusilla, Tringa flavipes ou Tringa melanoleuca par exemple) et ardéidés et un reposoir à marée haute pour de nombreuses espèces d'oiseaux marins et limicoles. Sa fréquentation par les ornithologues guyanais en fait un site bien documenté.

Sources cartographiques:

La délimitation de cette ZNIEFF a été faite par photo interprétation de la BD Ortho 2005 (IGN).

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 5

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 6

Localisation

Relations type I/II

Communes

Kourou

Superficie

2,08 ha

Altitude(s)

De 0m à 3m

Commentaire général

Cette pointe rocheuse témoigne de l'avancée du socle qui distingue le littoral guyanais de celui de ses pays voisins en présentant ponctuellement des côtes rocheuses et collines boisées en front de mer.

Au coeur de la zone de balancement des marées, elle émerge de 4 à 5 mètres à marée basse.

La ZNIEFF constitue une zone d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, notamment pour les oiseaux marins et les limicoles migrateurs du continent nord-américain qui s'alimentent avec les Ardéidés sur les vasières de l'estuaire du Kourou et viennent se reposer sur les rochers à marée haute. Elle a ainsi une valeur ornithologique indéniable. Le petit lézard *Cnemidophorus cryptus* profite également de ce milieu xérique. Il s'agirait également d'une zone majeure de fréquentation pour le lamantin (nourrissage probable).

La Pointe des Roches constituant un lieu de promenade et de détente privilégié des Kourouciens, la faune est fréquemment dérangée.

Bilan des connaissances

Mammifères: Nul

Reptiles: Nul

Ptéridophytes: Nul

Champignons: Nul

Oiseaux: Moyen

Insectes: Nul

Bryophytes: Nul

Algues: Nul

Amphibiens: Nul

Phanérogames: Nul

Lichens: Nul

Habitats: Nul

Poissons: Nul

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF est délimitée par la limite des plus basses eaux de l'océan Atlantique et celle dans l'embouchure du fleuve Kourou.

Au sud et à l'ouest, la ZNIEFF est bordée par les milieux urbanisés de Kourou.

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

Rochers sans végétation

Statuts de propriété

Etablissement public

Facteurs d'évolution

Pollutions et nuisances

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement (avéré)

Pratiques liées aux loisirs

Chasse (avéré)

Processus naturels abiotiques

Erosions (avéré)

Géomorphologie

Côte rocheuse, falaise maritime

Mesures de protection

Autre

Aucune protection

Critères d'intérêt

Autres intérêts de la zone

Paysager

Pédagogique ou autre (préciser)

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Etapas migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Intérêts patrimoniaux

Faunistique

Oiseaux

Ecologique

Sources de données

Collection: GEPOG - Base de donnée Alapi

Informateur: GEPOG - Faune-Guyane

Informateur: Vincent Rufay - Biotope

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 12

Animalia/Aves

Buteo albonotatus

Calidris canutus

Calidris fuscicollis

Calidris himantopus

Calidris pusilla

Caracara cheriway

Charadrius wilsonia

Falco columbarius

Pluvialis dominica

Tringa flavipes

Tringa melanoleuca

Animalia/Reptilia

Cnemidophorus cryptus